

Blütenserenade

Standort:

Eine Mischung für absonnige bis halbschattige, trockene Standorte oder auch für sonnige Flächen auf etwas frischerem Boden.

Charakter:

Helle, zarte, blauviolette und rosafarbene Töne bestimmen das Bild dieser Kombination. Vor allem im Herbst läuft die Mischung mit Pfeifengräsern, Schirm-Astern und Herbst-Anemonen zu voller Pracht auf. Ihre filigrane Wirkung entfaltet sie jedoch nur auf größeren Flächen.

Anwendungsgebiete:



Geeignet ist diese Staudenmischung für größere Flächen im öffentlichen und gewerblichen Grün wie Parkanlagen, Verkehrsinseln und Straßenbegleitgrün.

Pflege:

Es erfolgt eine bodennahe Komplettmahd im Spätwinter.

4-6 AKmin/qm/a

NAME BOTANISCH	NAME DEUTSCH	PFLANZENINFOS	ALTERNATIVARTEN/-SORTEN	PFLANZ-/PFLEGEHINWEISE
Gerüststauden				
<i>Anemone tomentosa</i> ‘Serenade’	10 Herbst-Anemone	von Spätsommer bis Herbst in dunklem Altrosa blühend	‘Septemberglanz’ - rosa, ‘Honorine Jobert’ - weiß, ‘Bressingham Glow’ - rosa, leicht gefüllt	
<i>Aster umbellatus</i> ‘Weißer Schirm’	8 Schirm-Aster	cremefarbene Blütenschirme im Spätsommer bis Frühherbst		
<i>Molinia arundinacea</i> ‘Transparent’	5 Rohr-Pfeifengras	heimische Wildstaude, trichterförmig aufrechtes Gras, gelbliche Herbstfärbung	<i>Calamagrostis brachytricha</i>	
Begleitstauden				
<i>Calamintha nepeta</i> ‘Triumphator’	80 Steinquendel	heimische Wildstaude, lange Blütezeit, Insektenmagnet, glänzendes aromatisches Laub		Sorte mit glänzendem Laub - Lieferung kontrollieren!
<i>Aruncus aethusifolius</i> ‘Misty Lace’	40 Geißbart	kleiner Geißbart mit cremeweißen Blüten	<i>Aruncus aethusifolius</i> ‘Johannifest’	
<i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i>	60 Purpurglöckchen	Blattschmuckstaude, samtig behaartes Laub, halbwintergrün, kleine cremefarbene Blüten-glöckchen	<i>Heuchera villosa</i> ‘Brownies’	
Bodendeckstauden				
<i>Alchemilla erythropoda</i>	100 Günsel	heimische Wildstaude, schwachwachsend, kleine Art	<i>Geranium x cantabrigiense</i> ‘St. Ola’	
<i>Carex umbrosa</i>	120 Segge	heimische Wildstaude, feinlaubig, niedrig wachsend, immergrün	<i>Carex digitata</i>	
<i>Epimedium</i> ‘Orangekönigin’	100 Elfenblume	wüchsige Sorte mit hellorangenen Blüten		
Füller				
<i>Viola corsica</i>	150 Korsisches Stiefmütterchen	niedriger, großblumiger Dauerblüher in Violett-blau, kurzlebig und versamend	<i>Viola sororia</i>	kurzlebig - versamt sich in Lücken
Zwiebel- und Knollenpflanzen				
<i>Allium nigrum</i>	150 Schwarzer Lauch	zuverlässiger Zierlauch mit weißen Blüten in halbkugeligen Dolden		einzelnen oder in kleinen Gruppen setzen
<i>Anemone blanda</i> ‘Blue Shades’	1000 Balkan-Windröschen	große, blaue Blütensterne, versamend		Rhizome dürfen vor dem Pflanzen nicht austrocknen
<i>Anemone blanda</i> ‘White Splendour’	1000 Balkan-Windröschen	große, weiße Blütensterne, versamend		Rhizome dürfen vor dem Pflanzen nicht austrocknen



Kontakt:
Hochschule Anhalt | Anhalt University of Applied Sciences
Arbeitsgruppe Pflanzenverwendung
Strenzfelder Allee 28 | 06406 Bernburg (Saale)
Jessica Fenzl | E-Mail: jessica.fenzl@hs-anhalt.de