

Name botanisch/deutsch	Stk./40 m ² (4×10 m)
1 Gehölze	insgesamt 7
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Early Sensation' · Rispen-Hortensie	2
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Little Angel' · Roter Teufelsstrauch	3
<i>Sambucus nigra</i> 'Black Lace' · Purpurlättriger Holunder	2
2 Gerüststauden	insgesamt 24
<i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' · Großblütige Schönaster	6
<i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah' · Purpur-Rutenhirse	6
<i>Phlox</i> 'Minnehaha' · Sommer-Phlox	12
3 Begleitstauden	insgesamt 58
<i>Aster</i> × <i>herveyi</i> 'Twilight' · Herzblatt-Aster	12
<i>Geranium</i> × <i>psilostemon</i> 'Patricia' · Armenischer Storchschnabel	28
<i>Heuchera</i> 'Brownies' · Rotes Samtlaub-Silberglöckchen	18
4 Bodendeckstauden	insgesamt 96
<i>Aster ageratoides</i> 'Adustus Nanus' · Zwerg-Wild-Aster	12
<i>Brunnera macrophylla</i> 'Jack Frost' · Silbriges Kaukasus-vergissmeinnicht	24
<i>Hakonechloa macra</i> · Japan-Waldgras	36
<i>Heuchera micrantha</i> 'Amethyst Myst' · Purpurglöckchen	24
5 Füllpflanzen	insgesamt 15
<i>Euphorbia amygdaloides</i> 'Purpurea' · Mandelblättrige Purpur-Wolfsmilch	15
6 Blumenzwiebeln und -knollen; Pflanzung im Herbst	
<i>Hyacinthoides hispanica</i> 'Blue Queen' · Spanisches Hasenglöckchen	150
<i>Scilla siberica</i> 'Spring Beauty' · Sibirischer Blaustern	300
<i>Tulipa viridiflora</i> 'Esperanto' · Viridiflora-Tulpe	200

Merkmale und Hinweise · Alternativart /-sorte

4 % der Gesamtmenge von 200 Gehölzen und Stauden

weiß-rosa Blüte, Blickfang in der Blütezeit von Juli bis September; kann ab 3. Standjahr jährlich kräftig zurückgeschnitten werden · *H.* 'Pinky Winky' o. 'Candlelight'

tief braunrotes Laub; im Wechsel mit den anderen Gehölzen positionieren
· *P.* 'Tiny Wine'

purpurfarbenedes Laub, über die gesamte Vegetationsperiode Blickfang in diesem Konzept; zentral positionieren, in den ersten Jahren konkurrenzfreie Baumscheibe gewähren

12 % der Gesamtmenge von 200 Gehölzen und Stauden

zartviolette, asternähnliche Blüte, lange Blütezeit von Juli bis Oktober, langlebig; einzeln einstreuen

bordeauxrotes Blattwerk, besonders in der 2. Jahreshälfte wertvolle Gerüstpflanze; einzeln im mittleren Bereich positionieren

rötlich-violette bis rosa Blüte, robuste Sorte; in Tuffs vorrangig im mittleren Bereich

29 % der Gesamtmenge von 200 Gehölzen und Stauden

lavendellilaue Blüten im Aug.-Sept.; einzeln oder in Tuffs

hellmagentarote Blüten von Juni bis September; in Tuffs ganzflächig einstreuen
· *G.* 'Pink Penny'

Laub rötlich-grün, ganzjähriger Blattschmuck [W]; in Tuffs oder einzeln einstreuen
· *H.* 'Mocha'

48 % der Gesamtmenge von 200 Gehölzen und Stauden

üppige Polster, hellviolette Blüten, Spätsommerblüher; einzeln oder in Tuffs ganzflächig einstreuen

auffällig silbriger Blattschmuck und hellblaue Blüten im Frühjahr; in Tuffs einstreuen, vollsonnige Randlagen meiden

elegant überhängendes, frischgrünes Laub, wirksam ab Mai; in Tuffs oder einzeln einsetzen, auch gut am Rand

purpurfarbene, silbrig überhauchte Blätter, immergrün, schöner Winteraspekt [W], robust; ganzflächig einstreuen

7 % der Gesamtmenge von 200 Gehölzen und Stauden

dunkelrotes Laub, [W], dadurch ganzjährig attraktiv, relativ kurzlebig, versamt in Lücken; einzeln pflanzen!

200 hohe / 450 niedrige Geophyten zusätzlich zur Gesamtmenge

hellblaue Blüte im Mai, anspruchslos und dauerhaft, bildet schöne Bestände

blaue Blütenpracht im Vorfrühling (März–April), verwildernd und dauerhaft
· *S. siberica*

dreifarbige rosarot-grün-weiß; in den ersten Jahren effektiv, meist nicht dauerhaft
· *T. viridiflora* 'Doll's Minuette' oder 'Pimpernell'

[W] Winterwirkung durch Strukturen und Texturen oder wintergrüne Belaubung