

Name botanisch/deutsch	Stk./40 m ² (4×10 m)
1 Gehölze	insgesamt 7
<i>Hydrangea paniculata</i> 'Limelight' · Rispen-Hortensie	2
<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Dart's Gold' · Goldgelbe Blasenspiere	2
<i>Sambucus racemosa</i> 'Lemony Lace' · Gelblättriger Schlitz-Holunder	3
2 Gerüststauden	insgesamt 6
<i>Calamagrostis varia</i> · Berg-Reitgras	6
3 Begleitstauden	insgesamt 16
<i>Aster divaricatus</i> 'Tradescant' · Weiße Wald-Aster	16
4 Bodendeckstauden	insgesamt 166
<i>Brunnera macrophylla</i> · Kaukasusvergissmeinnicht	30
<i>Carex oshimensis</i> 'Evergold' · Goldrand-Japansegge	34
<i>Epimedium</i> × <i>versicolor</i> 'Sulphureum' · Schwefelgelbe Elfenblume	36
<i>Hakonechloa macra</i> 'Aureola' · Japan-Goldbandgras	36
<i>Heuchera villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> · Zottiges Silberglöckchen	30
5 Füllpflanzen	insgesamt 40
<i>Euphorbia polychroma</i> · Goldwolfsmilch	28
<i>Helleborus foetidus</i> · Palmblatt-Schneerose	12
6 Blumenzwiebeln und -knollen; Pflanzung im Herbst	
<i>Narcissus cyclamineus</i> 'Rapture' · Cyclamineus-Narzisse	150
<i>Narcissus jonquilla</i> 'Pipit' · Engelstränen-Narzisse	150
<i>Scilla siberica</i> 'Spring Beauty' · Blausternchen	450
<i>Tulipa viridiflora</i> 'Spring Green' · Viridiflora-Tulpe	100

Merkmale und Hinweise · Alternativart /-sorte**3 % der Gesamtmenge von 235 Gehölzen und Stauden**

cremeweiße Blüte, Blickfang in der Blütezeit von Juli bis September; im Kernbereich positionieren, kann ab dem 3. Standjahr jährlich kräftig zurückgeschnitten werden • *H.* 'Skyfall'

leuchtend gelbes Laub; im Wechsel mit den anderen Gehölzen positionieren • *P.* 'Angel Gold'

goldgelbes Laub, über die gesamte Vegetationsperiode Blickfang in diesem Konzept; zentral positionieren, in den ersten Jahren konkurrenzfreie Baumscheibe gewähren • *S.* 'Golden Lace'

3 % der Gesamtmenge von 235 Gehölzen und Stauden

Blickfang und wertvolle Gerüstpflanze in der 2. Jahreshälfte, Ährenrispen bleiben bis in den Winter attraktiv; einzeln innerhalb des Kernbereichs positionieren

7 % der Gesamtmenge von 235 Gehölzen und Stauden

robust und wuchsfreudig, weiße Blütenwolken bieten wertvollen Aspekt im Spätsommer und Herbst, Bienenweide; einzeln oder in Tuffs einstreuen

70 % der Gesamtmenge von 235 Gehölzen und Stauden

hellblaue Blüte, wertvoll für den Frühlingsaspekt; in Tuffs einstreuen, vollsonnige Randlagen meiden

auffällig cremeweiß gerandete Blätter, wintergrün; einzeln oder in Gruppen einstreuen • *C. morrowii* 'Variegata'

schwefelgelbe Blüte im Frühjahr, immergrün, [W], im Winter teils rötlich gefärbt, solide Bodendeckerqualitäten; einzeln oder in Tuffs

elegant überhängende, gelb gestreifte Blätter, wirksam ab Mai; in Tuffs oder einzeln einsetzen, auch gut am Rand

ganzjähriger Blattschmuck, frischgrüne Blätter; in Tuffs oder einzeln einstreuen

17 % der Gesamtmenge von 235 Gehölzen und Stauden

gelbe Blüten, wertvoller Frühjahrsblüher; einzeln oder in Tuffs ganzflächig einstreuen

wintergrüner Blattschmuck, frühe hellgrüne Blüte ab Januar, dadurch wertvoller Aspekt im Spätwinter, kurzlebig, versamt; einzeln einstreuen

400 hohe / 450 niedrige Geophyten zusätzlich zur Gesamtmenge

nickende, gelbe Blüte im März/April, verwildernd und in der Regel dauerhaft • *N.* 'Peeping Tom'

zartgelbe Blüte, verwildernd und dauerhaft

blauer Frühblüher (März–April) verwildernd und dauerhaft

elfenbeinweiße Blüte, in den ersten Jahren effektiv, meist nicht dauerhaft