

Standort: frisch bis mäßig trocken; durchlässige Böden **Licht:** sonnig **Farbe:** gelb und weiß, blau und rot
Anwendungsgebiete: für öffentliche und private Anlagen;
Für einige Arten ist es vorteilhaft, wenn am Standort keine extreme Trockenheit vorherrscht.
Pflege: Komplettmahd im Spätwinter; 2 bis 4 Jätgänge pro Jahr; Zeitaufwand für die Pflege 1,5-2,7 AKmin/m²/Jahr.

Farbensaum

Artenliste und Charakteristik

Veitshöchheimer Mischung

Name (botanisch - deutsch)	Stück/100m ² (empfohlener Mengenananteil)	Hinweise (W: Winterwirkung durch Strukturen und Texturen oder wintergrüne Belaubung)	Alternativart/-sorte
1. Gerüstbildner			
Aster ericoides ‚Herbstmyrthe‘ Myrten-Aster	10	standfeste hohe Art, weiße, fein verzweigte Blütenstände im Herbst, sehr feines Laub	
Aster ericoides ‚Blue Wonder‘ - Myrten-Aster	10	hellblaue Ergänzung zur vorigen Art	
Aster macrophyllus - Großblättrige Aster	20	Sommerblüher in Violett, Selbstaussaat	
Aster macrophyllus ‚Albus‘ (= Aster schreberi) Großblättrige Aster	10	Sommerblüher in Weiß, Selbstaussaat	
Centaurea dealbata ‚Steenbergii‘ Kaukasus-Flockenblume	30	großblumige intensiv rosa blühende Art	Centaurea hypoleuca ‚John Coultts‘
2. Begleitstauden			
Aquilegia vulgaris Gewöhnliche Akelei	50	sehr vielgestaltige, variable Art. Blütenfarben von blau über violett bis rosa und weiß, Selbstaussaat ggf. kontrollieren	
Aster amellus ‚Veilchenkönigin‘ Berg-Aster	30	blauvioletter, kompakter Herbstblüher; auf Sandböden Alternativ-Arten verwenden	Aster sedifolius ‚Nanus‘
Buphthalmum salicifolium ‚Alpengold‘ Ochsenauge	30	Sommerblüher in gelb	Buphthalmum salicifolium
Euphorbia epithymoides (Syn. Euphorbia polychroma) - Bunte Wolfsmilch	40	sehr schöne Art mit Langzeitwirkung. Hochblätter goldgelb; im Herbst oft rotbraun verfärbt. Samenstände rot	
Luzula nivea ‚Schneehäschen‘ Schnee-Hainsimse	80	die schneeweißen Blüten ergänzen im Frühsommer die kräftigen Farben der Bodendecker; Selbstaussaat ggf. kontrollieren [W]	Sesleria heuffleriana
3. Füllpflanzen (kurzlebige und ggf. einjährige Arten)			
Meconopsis cambrica - Wald-Scheinmohn	80	Langblüher in Gelb, erhält sich durch Selbstaussaat	
4. Bodendecker			
Alchemilla erythropoda - Karpaten-Frauenmantel	80	schwachwachsende, zwergige Art. Ganze Pflanze dicht samtig behaart.	
Anemone sylvestris Hain-Anemone, Großes Windröschen	70	flächige Ausbreitung durch Wurzelsprosse, weiße Schalenblüten im Mai bis Juni, häufige Nachblüte im September/Oktober, nicht für Sandböden	
Centaurea bella - Schöne Flockenblume	80	niedriger Teppich mit zart rosa Blüten im Sommer	
Geranium x magnificum - Pracht-Storchschnabel	50	dunkelviolette großblumige Art, horstiger Wuchs	Geranium renardii ‚Philippe Vapelle‘
Geranium sanguineum ‚Album‘ Blut-Storchschnabel	70	feingliedriges Laub und weiße Blüten geben der Pflanzung eine duftige Note	
Geranium sanguineum ‚Apfelblüte‘ Blut-Storchschnabel	60	niedrige Sorte, Blüte hellrosa	
5. Blumenzwiebeln und -knollen; Pflanzung im Herbst			
Anemone blanda ‚Blue Shades‘ Balkan-Windröschen	500	blauer Blütenteppich im April, in Tuffs zu 3 bis 5	
Anemone blanda ‚White Splendour‘ Weißes Balkan-Windröschen	500	weißer Blütenteppich im April, wüchsige, sterile Sorte mit langer Blütezeit; im Mai einziehend; in Tuffs zu 3 bis 5	
Chionodoxa luciliae ‚Blue Giant‘ Großer Schneeglantz	500	großblumige Art mit Fernwirkung	
Scilla mischtschenkoana - Kaukasischer Blaustern	500	sehr zeitig blühende, großblumige Art in Weiß bis Zartblau	

